


# Vacuna COVISHIELD® (ChAdOx1nCoV-19 recombinante)

Vector adenovirus recombinante de chimpancé, no replicativo

Es una plataforma conocida como “vector viral”.

Esta tecnología utiliza un adenovirus (virus distinto al SARS-CoV2) modificado para NO producir enfermedad generando una respuesta de anticuerpos segura.

Cada caja individual que presenta 50 frasco-ampollas multidosis. Cada frasco-ampolla o vial contiene 10 dosis de 0,5 mL cada una.




# Características de la Vacuna COVISHIELD

Solución para la aplicación intramuscular (IM) en región deltoides

Contiene 5 ml para vacunar a 10 personas (10 dosis), **0.5 ml cada dosis**

La información referida a número de lote permite la trazabilidad del biológico



# Esquema de Vacunación de COVISHIELD

<b>Número de dosis</b>	<b>2 (dos) dosis de aplicación intramuscular</b>
<b>Intervalo entre dosis</b>	<b>Mínimo:</b> Al menos <b>4 semanas</b> (28 días) a partir de la primera dosis. No administrar la 2da dosis antes de cumplidos los 28 días de la primera dosis. <b>Máximo:</b> <b>12 semanas</b> (84 días) de aplicada la 1º dosis.
	<b>Nota importante:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si la segunda dosis se administra inadvertidamente antes de transcurridas las 4 semanas desde la primera, no es necesario repetir la dosis.</li><li>• Si la administración de la segunda dosis se retrasa inadvertidamente más allá de las 12 semanas desde la primera dosis, debe administrarse lo antes posible.</li><li>• No se reiniciarán esquemas en ningún caso, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la aplicación de la primera dosis.</li></ul>
<b>Esquema completo</b>	Para lograr la máxima protección se debe completar el esquema de 2 (dos) dosis
<b>Simultaneidad</b>	La coadministración con otras vacunas del Calendario Nacional no ha sido evaluada y por tanto no se recomienda la aplicación simultánea. Se deber respetar un intervalo mínimo de 14 días con la aplicación de otras vacunas .



## Condiciones de conservación y uso

- La vacuna debe conservarse entre +2°C y +8°C (grados Celsius) protegida de la luz mientras el vial se encuentre cerrado.
- Luego de abierto el vial para la extracción de la primera dosis, se recomienda usar el contenido **dentro de las 6 horas siguientes.**
- La vacuna puede conservarse y utilizarse entre +2°C y +30°C (grados Celsius) durante el período de uso.
- Desechar cualquier vial abierto cuyo contenido no sea utilizado dentro de las primeras 6 horas.



# Otras consideraciones

- No agitar el vial.
- No almacenar el vial una vez abierto.
- **No congelar**
  - No utilizar el producto ante viales y ampollas con integridad y etiquetado deteriorados, con un cambio en las propiedades físicas (turbidez, tinción), con una vida útil caducada, o almacenamiento inadecuado.

Cualquier desvío de temperatura debe informarse inmediatamente, mantener las vacunas identificadas y a temperatura de +2 a +8°C.

El informe debe incluir la descripción de los eventos que llevaron al desvío. El nivel central evaluará los datos y confirmará si la vacuna es adecuada o no para su uso.



Los contactos estrechos de caso confirmado deben vacunarse después de completado el aislamiento correspondiente.

## Contraindicaciones

- » Antecedentes de **alergia (hipersensibilidad)** a cualquier componente de la vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares
- » Antecedente **anafilaxia o de reacciones alérgicas graves** (que impliquen compromiso respiratorio que requiera asistencia médica)

### \*Contraindicaciones para la administración de la 2da dosis:

Reacción alérgica generalizada y grave posterior a la inyección de la 1er dosis de la vacuna.

## Precauciones

- » **Enfermedad febril aguda grave** que implique compromiso del estado general
- » **Trastornos de la coagulación o trombocitopenia** como con cualquier vacuna de aplicación IM por el riesgo de generar hemorragias o hematomas post aplicación

Actualmente esta vacuna está recomendada para personas a partir de **los 18 años** independientemente del antecedente de haber padecido COVID-19.



# Efectos adversos más frecuentes de la vacuna COVISHIELD

**Locales:** dolor, hinchazón, hematoma, enrojecimiento, picazón o aumento de temperatura en el lugar de la inyección.

**Generales:** malestar general, febrícula o escalofríos, fatiga, náuseas, cefalea, mialgias, artralgias u otras reacciones a corto plazo como cuadro similar a una gripe de corta duración (caracterizado por escalofríos, fiebre, dolores articulares y musculares, cansancio, malestar general y dolor de cabeza).

En el caso de haberse aplicado simultáneamente con otra vacuna o con un intervalo menor a 14 días, deberá realizarse la notificación correspondiente del ESAVI.

