

Vacunación mayores de 65 años

Deben recibir **vacuna para covid + antigripal anual + evaluar vacuna antineumocócica** (independientemente sean sanos o con comorbilidades) NO recibieron vacunas contra neumococo (no hay registro / no recuerdan)

Escenario 1: 1º y 2º dosis de Vacunas para COVID AZ * aplicadas

* AZ: Vacuna de AstraZeneca (Covishield) del Serum Institute de la India

1º dosis de vacuna COVID-AZ - **intervalo 8 – 12 semanas**-
2º dosis de vacuna COVID-AZ

Intervalo entre vacuna COVID AZ y otras vacunas 14 días

Vacuna Antigripal y/ó antineumocócica- Otras vacunas

Escenario 2: recibió 1º dosis de Vacunas para COVID AZ

1º dosis de vacuna COVID-AZ

Intervalo entre vacuna COVID AZ y otras vacunas 14 días

Vacuna Antigripal y/ó antineumocócica
Otras vacunas

Intervalo entre otras vacunas y vacuna COVID AZ y 14 días

2º dosis de vacuna COVID AZ

Intervalo entre 1º y 2º dosis de vacuna COVID AZ 8-12 semanas

Escenario 3: recibió Vacuna antigripal- antineumocócica –otras, sin vacuna COVID AZ

Vacuna Antigripal y/ó antineumocócica
Otras vacunas

Intervalo entre otras vacunas y vacuna COVID AZ 14 días

1º dosis de vacuna COVID-AZ

Intervalo entre 1º y 2º dosis de vacuna COVID AZ 8-12 semanas

2º dosis de vacuna COVID AZ

Frente a urgencias (dT/ gamma/ rabia, etc.)se aplicarán sin considerar intervalo

PERSONAL DE SALUD

Deben recibir vacuna para covid + antigripal anual (AG) + solo aquellos con factores de riesgo (FR) evaluar vacuna/s antineumocócica/s

1- Recibió esquema completo de vacuna COVID-SPUTNIK V

1º + 2º dosis de vacuna COVID-SPUTNIK-V

intervalo 14 días

SIN FR aplicar Solo vacuna (AG)

CON FR aplicar vacuna AG + antineumocócica PCV13/ PSV23 si corresponde

2- Recibió 1º dosis de vacuna COVID-SPUTNIK V

1º dosis vacuna COVID-Sputnik

intervalo 14 días (*)

1) SIN FR
Aplicar Solo vacuna AG
2) CON FR
Aplicar vacuna AG + antineumocócica si corresponde

intervalo 14 días

2º dosis vacuna COVID-Sputnik

intervalo entre dosis de vacuna COVID-SPUTNIK V 3 semanas (2º dosis a partir del día 21)

(*) si no dan los tiempos terminar esquema de vacuna COVID y luego aplicar antigripal

3- Recibió vacuna AG / otras vacunas , sin dosis de vacuna COVID-SPUTNIK V

vacuna AG y/ u otras vacunas

intervalo 14 días

1º dosis vacuna COVID-SPUTNIK V

intervalo 3 semanas (2º dosis a partir del día 21)

2º dosis vacuna COVID-SPUTNIK V

ACLARACIONES

- AG con otras vacunas entre ellas

- antineumocócica

- Prevenir 13 (PCV13) / 23 valente (PSV23) = sin intervalo

- AG con vacuna COVID= 14 días

- Otras vacunas con vacuna COVID= 14 días

- Frente a urgencias (dT/ gamma/ rabia/ hepatitis B)se aplicarán sin considerar intervalo

PERSONAL DOCENTES

Deben recibir vacuna COVID + solo en aquellos con factores de riesgo (FR) evaluar vacuna antigripal anual (AG) vacuna/s antineumocócica/s

ACLARACIONES

- AG con otras vacunas entre ellas antineumocócica Prevenir 13 (PCV13) / 23 valente (PSV23) = sin intervalo
- AG con vacuna COVID= 14 días
- Otras vacunas con vacuna COVID= 14 días
- Frente a urgencias (dT/ gamma/ rabia/ hepatitis B)se aplicarán sin considerar intervalo

1- Recibió esquema completo de vacuna COVID-SINOPHARM

1º + 2º dosis de vacuna COVID-SINOPHARM (Intervalo 21-28 días)

intervalo 14 días

CON FR aplicar vacuna AG + antineumocócica PCV13/ PSV23 si corresponde

2- Recibió 1º dosis de vacuna COVID-SINOPHARM

1º dosis Vacuna COVID-SINOPHARM

intervalo 14 días (+)

CON FR Aplicar vacuna AG + antineumocócica

intervalo 14 días (+)

2º dosis vacuna COVID-SINOPHARM

intervalo entre dosis de vacuna COVID-SINOPHARM 21-28 días (2º dosis a partir del día 21)

(*) si no dan los tiempos terminar esquema de vacuna COVID y luego aplicar antigripal

3- Recibió vacuna AG / otras vacunas , sin dosis de vacuna COVID-SINOPHARM

vacuna AG y/ u otras vacunas

intervalo 14 días

1º dosis vacuna

intervalo entre dosis de vacuna COVID-SINOPHARM 21-28 días (2º dosis a partir del día 21)

2º dosis vacuna

PERSONAS de 60 a 64 años
Deben recibir vacuna COVID + solo en aquellos con factores de riesgo (FR) evaluar vacuna antigripal anual (AG) vacuna/s antineumocócica/s

1-Recibió esquema completo de vacuna COVID

1º + 2º dosis de vacuna

intervalo 14 días

CON FR aplicar vacuna AG + antineumocócica PCV13/PSV23 si corresponde

1-COVID-SPUTNIK
(Intervalo 21-28 días)

2- COVID AZ
(intervalo 8 -12 semanas)

2-Recibió 1º dosis de vacuna COVID

1º dosis Vacuna COVID-SPUTNIK/AZ

intervalo 14 días (+)

CON FR
Aplicar vacuna AG y/ó + antineumocócica Si corresponde

intervalo 14 días (+)

2º dosis vacuna COVID-SPUTNIK/AZ

(*) si no dan los tiempos terminar esquema de vacuna COVID y luego aplicar antigripal

1- Vacuna COVID-SPUNIK V intervalo entre dosis 21-28 días (2º dosis a partir del día 21)

2- Vacuna COVID-AZ intervalo entre dosis 8 – 12 semanas

ACLARACIONES

- AG con otras vacunas entre ellas antineumocócica Prevenar 13 (PCV13) / 23 valente (PSV23) = sin intervalo**
- AG con vacuna COVID= 14 días**
- Otras vacunas con vacuna COVID= 14 días**
- Frente a urgencias (dT/ gamma/ rabia/ hepatitis B)se aplicarán sin considerar intervalo**