

Santa Fe, 23 de Abril de 2026

Recomendaciones para los equipos de Salud

Frente a esta alta demanda de vacunación antigripal, remarcamos algunos conceptos importantes:

- 1- La vacunación de la población objetivo será de manera sucesiva y dinámica dependiendo de la disponibilidad de dosis y la capacidad operativa de cada efector.
- 2- Se debe vacunar cada año porque el virus de la gripe tiene la potencialidad de cambiar, por eso hay que fabricar una vacuna adaptada a las modificaciones que haya sufrido el virus en base a la información de los centros de referencia.
- 3- El subclado K del virus de la influenza A (H3N2) ha emergido como la cepa predominante en el mundo. Las vacunas disponibles para la temporada 2025-2026 en Argentina, que siguen recomendaciones internacionales, están diseñadas para proteger contra las cepas circulantes, incluyendo el subclado K.
- 4- Es una prioridad iniciar la vacunación idealmente antes del comienzo del invierno (etapa de mayor circulación del virus influenza) y evitar oportunidades perdidas (cualquier visita al centro de salud por parte de un paciente que necesite vacunas y se vaya sin ellas).
- 5- De acuerdo al escenario epidemiológico nacional, regional y local, podrá continuarse según la dinámica de circulación viral hasta el vencimiento de las vacunas.
- 6- Las vacunas antigripales disponibles actualmente en Argentina son todas inactivadas.
- 7- Pueden co-administrarse junto con todas las vacunas del calendario y también con vacunas COVID 19. Se autorizó la coadministración con vacuna para Dengue por decisión de expertos.
- 8- Si no se aplican todas las vacunas juntas, no existe intervalo de tiempo a esperar para aplicar la vacuna Antigripal (no se debe indicar esperar un mes) o si recibió otras vacunas con cualquier intervalo de tiempo puede recibir la vacuna antigripal.
- 9- No existe interferencia con gammaglobulinas ni hemoderivados.
- 10- La cantidad de ovoalbúmina contenida en las vacunas antigripales que por su elaboración la contienen se estima $\leq 1 \mu\text{g/mL}$, considerándose segura en pacientes con alergia al huevo.
- 11- Aprovechar la instancia de esta vacuna para verificar necesidades de iniciar / completar esquemas de vacunación y registros

Contamos con 3 presentaciones:

1- **Vacuna trivalente inactivada (Agrippal® S1 Junior):** jeringas prellenadas monodosis de 0,25 mL. Para niños desde 6 meses a 35 meses

2.1-**Vacuna trivalente inactivada (Agrippal® S1):** jeringas prellenadas monodosis de 0,5 mL.

2.2-**Vacuna trivalente inactivada (Influvac®)** jeringas prellenadas monodosis de 0,5 mL.

Para niños desde 3 años en adelante, adolescentes, adultos y adultos mayores

3- **Vacuna trivalente adyuvantada (Fluad®):** jeringas prellenadas monodosis de 0,5 ml.

Para adultos desde los 65 años, la respuesta de anticuerpos a Fluad® es mayor cuando se compara con la de otras vacunas que carecen de adyuvante.

No está indicada para su uso en niños y no se dispone de datos sobre el uso de Fluad® en embarazadas

Evaluando la oportunidad de vacunación y el stock disponible, se puede utilizar:

- **Media dosis de (Agrippal® S1) / (Influvac®) para pediatría.** Para esto, desechar la mitad del volumen que contiene la jeringa (hasta la marca indicada en el cuerpo) antes de la inyección, para dar la dosis correcta y asegurarse que no se utilice el resto.
- **dos dosis de vacuna pediátrica (Agrippal® S1 Junior):** para vacunar a un niño desde 3 años – adolescente - adulto (2 inyecciones de 0,25 ml). Explicando a la persona que se vacuna que son 2 inoculaciones, no puede juntarse en una jeringa el contenido de ambas,
- **Vacuna trivalente adyuvantada (Fluad®):** puede aplicarse en personas a partir de los 50 años

¿Cómo es el esquema de vacunación de acuerdo con la edad y existencia de dosis previas?

Edad	Primo vacunación (primera vez que recibe antigripal)	Contaba con 1 dosis previa	Contaba con 2 dosis previa (en la misma temporada o distintas)
6 a 24 meses Con o sin Comorbilidades	Esquema = 2 dosis Presentación= 0,25 mL (una dosis de Agrippal® S1 Junior) o la mitad de la dosis de (Agrippal®S1 o Influvac®). El intervalo mínimo entre primera y segunda dosis es de cuatro (4) semanas.		Esquema = 1 dosis Presentación= 0,25 mL (una dosis de Agrippal® S1 Junior) o la mitad de la dosis de (Agrippal® S1 o Influvac®).
25 a 35 meses con comorbilidad o indicación individual (trae la vacuna comprada)			

Edad	Primo vacunación (primera vez que recibe antigripal)	Contaba con 1 dosis previa	Contaba con 2 dosis previa (en la misma temporada o distintas)
3 años a 8 años Pertenece a grupos de riesgo ó recomendación individual (trae vacuna comprada)	Esquema = 2 dosis Presentación: 0,5 mL. (Agrippal®S1 ó Influvac®). El intervalo mínimo entre primera y segunda dosis es de cuatro (4) semanas		Esquema = 1 dosis Presentación: 0,5 mL. (Agrippal®S1 ó Influvac®).
Desde 9 años en adelante	Esquema = 1 dosis Presentación: 0,5 mL. (Agrippal® S1 o Influvac®). ATENCIÓN!! Si inició el esquema antes de los 9 años y cumple 9 antes de su 2° dosis debe recibirla para completar el esquema		Esquema = 1 dosis Presentación: 0,5 mL. Agrippal® S1 o Influvac®).

Les agradecemos el esfuerzo diario y les pedimos contención para una población que está solicitando la vacuna

Recuerden frente a inconvenientes que estamos a disposición

Equipo PAI Central

santafevacuna@yahoo.com.ar